

*Sådan gøder og  
kalker man sin have*

A blue watering can is shown pouring water over a variety of colorful flowers in a garden. The water is captured in mid-air, creating a spray effect. The flowers include pink, white, and purple blooms. The background is a soft-focus green garden.  
**Møllerens**  
*Gødning*

## Hvordan får man en veltrimmet græsplæne?

En græsplæne kræver gødning; f.eks. Møllerens Universalgødning NPK 14-3-15

Græsplænen kræver desuden havekalk en gang om året, og er der problemer med mos, gives der f.eks. Jernvitriol, som gør mosset sort, hvorefter det rives væk.

### Anlæg af græsplæne:

1. Grovplanering, hvor store sten o. lign. fjernes.
2. Jordforbedring (svær lerjord tilføres sand og let sandjord tilføres muld. Tilsæt ca. 10 cm sand/muld og bland det ved fræsning).
3. Sammentrædning af jorden (fjerner bløde pletter og luftlommer for at undgå, at plænen bliver ujævn).
4. Finplanering (træk en planke, stige eller lign. hen over jorden og udglat ujævnheder med en rive).
5. Grundgødskning (tilfør f.eks. 5 kg Plænegødning pr. 100 m<sup>2</sup>).
6. Riv arealet over for at få gødningen blandet med jorden. Jorden skal være løs i 1-2 cm dybde.
7. Bland græsfrøene (2,5 - 4 kg pr. 100 m<sup>2</sup>) grundigt før såning.
8. Del frøene i 2 og så af 2 gange vinkelret på hinanden enten med maskine eller med hånd.
9. Dæk frøene ved rivning med max 0,5 cm jord.
10. Er jorden meget tør afsluttes med tromling.

En nyanlagt græsplæne skal være 6-8 cm før første klipning. Klippehøjden sænkes derefter gradvist. Klip kun 1-2 cm af pr. gang.

### Nedenunder ses doseringerne på de forskellige hjælpemidler til haven:

#### Møllerens Universalgødning, til græsplænen

##### NPK 14 - 3- 15 m/ Mg, B, S

Brug ca. 2,5 - 3 kg pr 100 m<sup>2</sup> i marts / april

Brug ca. 2,5 - 3 kg pr 100 m<sup>2</sup> i juni

Brug ca. 2,5 - 3 kg pr 100 m<sup>2</sup> i august / september.

#### Møllerens Universalgødning NPK 14-3-15 - til hele haven

Til køkkenhaven anbefaler vi at bruge Møllerens Universalgødning NPK 14-3-15 clorfattig. Generelt skal der bruges ca. 2 kg pr. 100 m<sup>2</sup> i maj, juni og juli måned. Tidlige afgrøder som rabarber, løg, ribs, solbær skal startes i april.



Kulturer	Gødningstilførsel angivet som * = 1 kg 14-3-15 pr. 100 m <sup>2</sup>											
	jan.	feb.	marts	apr.	maj	juni	juli	aug.	sep.	okt.	nov.	dec.
Agurk					**	**	**					
Bønner, ærter	OBS PK-gødning 0-4-21				**							
Græs				***		***		****				
Gulerod (sommer)				**	**	**						
Hindbær			**			**						
Jordbær							**	**				
Kartoffel (tidlig)				**	***	***						
Kål					***	***	***	***				
Persille					**	**		**				
Porre					**	**	**	**	**			
Purløg				**	**	**	**					
Rabarber			***	***		**						
Rododendron			**	**		**						
	OBS! Svovlsur ammoniak											
Ribs, solbær, stikkelsbær			***	**			***					
Rødbede				**	***	**	**					
Selleri				**	***	***	***	**				
Spiseløg			***	***								
Tomat						***	***	**				